Тестовые вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая

1. Рекомендации консультантов реализуются:
1) по согласованию с лечащим врачом
2) по желанию пациента или его законного представителя
3) по указанию главного врача
Правильный ответ - 1
2. Может ли лечащий врач отказаться от наблюдения и лечения пациента?
1) не может ни в коем случае
2) может, если это не угрожает жизни пациента, здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка ЛПУ по согласованию с соответствующим должностным лицом
3) может, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка ЛПУ без согласования с соответствующим должностным лицом
Правильный ответ - 2
3. Имеет ли право пациент на предоставление ему копий медицинских документов, отражающих состояние его здоровья?
1) не имеет
2) имеет в случаях, когда в них не затрагиваются интересы третьей стороны
3) имеет в любом случае
Правильный ответ - 3
4. Какую ответственность могут нести медицинские работники за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну с учетом причиненного гражданам ущерба?
1) дисциплинарную
2) административную
3) уголовную
4) дисциплинарную, административную, уголовную
Правильный ответ - 4
5. Средства защиты используются при приеме:
1) носителей вируса гепатита В
2) ВИЧ-инфицированных больных
3) всех пациентов
Правильный ответ - 3
6. Режим обработки стоматологических наконечников после каждого пациента:
1) двукратное протирание 70% спиртом с интервалом 15 минут
2) двукратное протирание 0,5% раствором спиртового хлоргексидина с интервалом 15 минут
3) автоклавирование в автоклаве класса «В»
Правильный ответ - 3
7. Стерилизации подвергаются изделия медицинского назначения:
1) контактирующие с кровью, слюной пациента
2) контактирующие с кожей пациента
3) все изделия медицинского назначения
Правильный ответ - 3
8. Разрешается ли курение в помещении медицинского учреждения?
1) да, в специально отведенных местах
2) только, если одновременно будут курить не более 2-х человек
3) нет

Правильный ответ - 3

9. Реализация права облегчения боли пациенту осуществляется:

1) по этическим аспектам
2) как необходимое условие качественного оказания стоматологической помощи
3) по желанию пациента
4) в любом из перечисленных случаев

Правильный ответ - 4

10. Укажите значение медицинской карты стоматологического больного

1) лечебно-диагностическое
2) научно-практическое
3) юридическое
4) воспитательное
5) не имеет существенного значения

Правильный ответ – 1,2,3,4

11. Дайте определение понятия «Диагноз»

1) краткое врачебное заключение о сущности заболевания, отражающее его нозологию, этиологию, патогенез и морфофункциональные проявления, сформулированное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями
2) изложение сути заболевания в произвольной форме
3) краткое изложение жалоб пациента на момент обращения
4) краткое изложение причин возникновения заболевания
5) субъективная оценка состояния пациента на момент обращения

Правильный ответ - 1

12. Укажите сроки хранения медицинской карты стоматологического больного

1) 3 года в регистратуре
2) 15 лет в регистратуре
3) в архиве 25 лет
4) 5 лет в регистратуре, далее 75 лет в архиве
5) 10 лет в регистратуре, далее 15 лет в архиве

Правильный ответ - 4

13. К развитию каких общесоматических осложнений могут привести хронические одонтогенные очаги инфекции?

1) аллергические реакции (крапивница и др.)
2) длительный субфебрилитет
3) полиартралгия
4) септическое состояние с гептической лихорадкой
5) бактериальный эндокардит

Правильный ответ - 1,2,3,4,5

14. При современных возможностях медицины следует ли отказываться от радикальной санации хронических одонтогенных очагов инфекции у больных, например, полиартралгий, длительном субфебрилитете неясной этиологии, ревматизмом даже в фазе обострения и др.?

1) в фазе обострения соматического заболевания следует отказать в радикальной санации
2) проводить консервативное лечение
3) по согласованию с лечащим врачом (пациента можно радикально санировать очаги инфекции под прикрытием антибактериальной, противовоспалительной и антиаллергической терапии
4) нужно еще доказать роль одонтогенной инфекции в соматическом осложнении
5) постараться избежать или по возможности затянуть решение о санации

Правильный ответ - 3

15. После введения лекарственного препарата (антибиотик, аналгетик и пр.)

появились признаки гиперергической реакции: зуд кожи, затруднение дыхания, охриплость голоса, тахикардия, снижение артериального давления, т.е. реакция по типу анафилактического шока.

Тактика врача и неотложная терапия:

1) вызвать аллергологическую скорую помощь, установить внутривенно капельницу с физраствором. Ввести внутривенно шприцом 1-2 мл раствора преднизолона + 2 мл раствора димедрола в капельницу, еще 2 мл преднизолона + 2,4% – 10 мл эуфиллина
2) открыть окна, проветрить помещение
3) предложить пациенту обильное питье
4) измерить артериальное давление крови
5) ругать друг друга за нерасторопность

Правильный ответ - 1

16. Какие из перечисленных местных анестетиков относятся к группе эфирных?

1) новокаин
2) лидокаин
3) дикаин
4) мепивакаин
5) артикаин
6) анестезин

Правильный ответ – 1,3,6

17. Аллергические реакции к сульфитам(стабилизаторам, предохраняющим катехоламины от окисления) наиболее часто выявляются:

1) при тиреотоксикозе
2) при сахарном диабете
3) при бронхиальной астме
4) при ИБС
5) при контактном дерматите
6) при пиелонефрите

Правильный ответ - 3

18. Наименее токсичным местным анестетиком является:

1) новокаин
2) лидокаин
3) тримекаин
4) мепивакаин
5) артикаин
6) бупивакаин

Правильный ответ - 1

19. При проведении местной анестезии пациенту, страдающему узкоугольной формой глаукомы можно использовать следующие местные анестетики на основе:

1) артикаина с адреналином 1:100000
2) артикаина с адреналином 1:200000
3) мепивакаина без вазоконстриктора
4) лидокаина без вазоконстриктора
5) лидокаина с вазоконстриктором

Правильный ответ – 3,4

20. Препарат Ultracain D-S forte отличается от препарата Ultracain D-S:

1) большей концентрацией местного анестетика
2) большей концентрацией вазоконстриктора
3) большим объемом карпулы
4) введением специальных добавок

Правильный ответ - 2

21. Основа действия прибора «Диагнодент» основана на

1) ультразвуковой вибрации
2) электрическом токе
3) лазерном излучении
4) ультрафиолетовом свете
Правильный ответ - 3

22. Принцип биологической целесообразности заключается

1) в профилактическом расширении твердых тканей зуба до иммунных зон
2) в максимальном сохранении видимо здоровых тканей
Правильный ответ - 2

23. Заключительным этапом препарирования кариозной полости является

1) финирование
2) формирование
Правильный ответ - 1

24. При пломбировании полости второго класса с использованием матрицедержателя он накладывается:

1) всегда после смывания протравливающего геля
2) после изоляции зуба от слюны
3) не имеет значения
4) после постановки подкладки
Правильный ответ - 2

25. Какова, на Ваш взгляд, основная причина большинства ошибок врача-стоматолога при диагностике кариеса?

1) действия врача
2) наличие диагностического оборудования
3) финансирование лечебного учреждения
4) все перечисленное
Правильный ответ - 1

26. Какие причины могут вызвать образование вторичного кариеса?

1) завышение прикуса
2) отсутствие контакта с зубами-антагонистами
3) отсутствие прокладки
4) неполное удаление измененных эмали и дентина
Правильный ответ - 4

27. Перечислите основные противопоказания к изготовлению прямых композитных виниров

1) наличие парафункции жевательных мышц, патологии прикуса, воспалительных заболеваний пародонта в стадии обострения
2) плохая гигиена полости рта, кариес корня, утрата более 30% твердых тканей зуба
3) аллергия к компонентам адгезивных систем, фотобиологическая реакция, заболевания зрения
4) все вышеперечисленное
Правильный ответ - 4

28. К каким осложнениям может привести сокрытие врачебной ошибки при неправильной диагностике кариеса?

1) к верхушечному периодонтиту
2) к пульпиту
3) к остеомиелиту
4) ко всему вышеперечисленному
Правильный ответ - 4

29. Протравливание эмали производится для усиления

1) бактерицидных свойств композитов
2) краевого прилегания композитов

Правильный ответ - 2

30. Органическая основа современных композиционных материалов – это

1) малеиновая кислота
2) смесь акриловых и эпоксидных смол
3) полиметилметакрилат
4) акриловый полимер
5) полиакриловая кислота

Правильный ответ - 2

31. Перед внесением адгезивной системы в кариозную полость зуба после кондиционирования необходимо:

1) тщательно высушить до появления матового оттенка эмали и дентина
2) слегка подсушить, чтоб оставались капельки воды на поверхности дентина
3) подсушить, чтоб оставался влажный блеск дентина

Правильный ответ - 3

32. Полимеризационнаям усадка композитов составляет в среднем

1) 2-5 %
2) 0,5-1 %
3) 0,05-0,01%
4) 5-8%

Правильный ответ - 1

33. Основными компонентами порошка стеклоиономерных цементов являются:

1) диоксид кремния, оксид алюминия и фторид кальция
2) фториды натрия и алюминия, фосфаты кальция или алюминия
3) оксид кремния и алюмосиликат
4) оксид кальция, смесь оксида цинка и хлористого цинка

Правильный ответ - 1

34. Соотношение оксид алюминия/диоксид кремния отвечает за реакцию схватывающего цемента. Реакция начинается:

1) при соотношении алюминий/кремний больше 2:1
2) при соотношении алюминий/кремний меньше 2:1
3) при соотношении алюминий/кремний 2:1
4) не имеет значения

Правильный ответ - 1

35. Для оптимального рабочего времени при неизменном времени отвердевания были разработаны добавки винной кислоты:

1) к порошку
2) к жидкости
3) к порошку или к жидкости
4) добавление винной кислоты не изменяет рабочее время

Правильный ответ - 3

36. Жидкость стеклоиономерного цемента обычно представляет собой

1) 47,5% (40-55%) водный раствор кополимера кислот
2) 37% ортофосфорная и малеиновая кислоты
3) акриловая и винная кислоты

Правильный ответ - 1

37. К группе гибридных восстановительных материалов относят:

1) Vitremer TC, Photac-Fil (Quick) (3M ESPE), Fuji II LC новая фjрмула (GC)
2) Vitrebond (3M ESPE), Aqua Cenit (VOCO), Fuji Lining LC (GC)
3) Rely X Luting (3M ESPE), Fuji Plus, Fuji Plus EWT, Fuji Cem, Fuji Ortho LC (GC)

Правильный ответ - 1

38. К группе подкладочных цементов относят:

1) Vitremer TC, Photac-Fil (Quick) (3M ESPE), Fuji II LC новая фjрмула (GC)

2) Vitrebond (3M ESPE), Aqua Cenit (VOCO), Fuji Lining LC (GC)
3) Rely X Luting (3M ESPE), Fuji Plus, Fuji Plus EWT, Fuji Cem, Fuji Ortho LC (GC)
Правильный ответ - 2

39. К группе фиксирующих материалов ооносят:
1) Vitremer TC, Photac-Fil (Quick) (3M ESPE), Fuji II LC новая фjрмула (GC)
2) Vitrebond (3M ESPE), Aqua Cenit (VOCO), Fuji Lining LC (GC)
3) Rely X Luting (3M ESPE), Fuji Plus, Fuji Plus EWT, Fuji Cem, Fuji Ortho LC (GC)
Правильный ответ - 3

40. Пульпа – это
1) волокнистая соединительная ткань
2) специализированная рыхлая соединительная ткань
3) специфическая ткань внутренней среды организма
4) совокупность волокон
Правильный ответ - 2

41. Клыки верхней челюсти чаще имеют:
1) 1 корень и два хорошо проходимых корневых канала
2) 2 корня и 2 канала
3) 1 корень и хорошо проходимый канал
4) 2 корня и 3 канала
Правильный ответ - 3

42. Боль ночная, приступообразная, острая, иррадиирующая по ветвям тройничного нерва характерна для:
1) острого серозно-гнойного пульпита
2) острого гнойно-некротического пульпита
3) невралгии тройничного нерва
4) хронического фиброзного пульпита
Правильный ответ - 2

43. Минимальный срок восстановления костной ткани при деструктивных формах периодонтита
1) 1-2 мес.
2) 6-9 мес.
3) 12-24 мес.
4) более 24 мес.
Правильный ответ - 2

44. Наиболее универсальный способ лечения необратимых форм пульпита:
1) экстирпация под анестезией
2) девитальная экстирпация
3) девитальная ампутация
4) витальная ампутация
Правильный ответ - 1

45. Что входит в состав пародонта?
1) десна, сосуды, периодонт, костная ткань альвеолы
2) десна, костная ткань альвеолы, цемент корня зуба, периодонт
3) зуб, десна, периодонт, слизистая переходной складки
Правильный ответ - 2

46. Какие индексы являются необратимыми?
1) PMA
2) CPITN
3) PI
4) ИГ
Правильный ответ - 3

47. Какие индексы являются гигиеническими?

1) CPITN
2) КПУ
3) PI
4) OHI-S
5) ИГ

Правильный ответ - 4,5

48. Дополнительным методом исследования регионарного кровообращения в пародонте является

1) рентгенография
2) эхоостеометрия
3) реопародонтография
4) полярография
5) гнатодинамометрия

Правильный ответ - 3

49. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта предпочтительно использовать зубные пасты:

1) с отбеливающим эффектом
2) противосенситивные
3) антитартар
4) противовоспалительные лечебно-профилактические
5) гелевые

Правильный ответ - 4

50. После прямой реставрации зубов передней группы при двукратной чистке зубов предпочтительно использовать зубную щетку:

1) с очень жесткой щетиной
2) с очень мягкой щетиной
3) средней степени жесткости
4) с мягкой щетиной
5) с жесткой щетиной

Правильный ответ - 3

51. Применение ультразвуковых аппаратов при проведении профессиональной гигиены полости рта:

1) всегда
2) никогда
3) если у пациента имеется очень большое количество мягкого налета
4) когда имеется налет курильщика
5) при наличии минерализованных зубных отложений

Правильный ответ - 5

52. Противопоказания использования пескоструйных аппаратов с оксидом алюминия:

1) профессиональная гигиена
2) бронхиальная астма
3) удаление минерализованных зубных отлоежний
4) удаление пигментированного налета с поверхности зубов
5) все вышеперечисленное

Правильный ответ - 5

53. Пациентам с гиперчувствительностью ополаскиватели полости рта назначают:

1) антиплак
2) с противовоспалительным эффектом
3) с противосенситивным эффектом
4) противокариесные
5) все вышеперечисленное

Правильный ответ - 3

54. Какое воздействие оказывает укороченная уздечка губы?

1) травматическое
2) вызывает вымывание кальция из альвеолярной кости
3) раздражающее действие на пародонт
4) нарушение микроциркуляции, локальную анемию, дистрофические изменения

Правильный ответ - 4

55. При каком заболевании пародонта образуется ложный карман?

1) язвенный гингивит
2) катаральный гингивит
3) гипертрофический гингивит
4) пародонтит

Правильный ответ - 3

56. Укажите рентгенологические признаки пародонтита:

1) остеосклероз
2) рисунок кости не изменен
3) резорбция вершин межзубной перегородки
4) остеопороз, исчезновение компактной пластинки, резорбция костной перегородки

Правильный ответ - 4

57. Назовите рентгенологические признаки пародонтоза

1) резорбция костной ткани, пародонтальные карманы
2) остеопороз
3) горизонтальная резорбция
4) атрофия альвеолярного гребня, очаги склероза

Правильный ответ - 4

58. Перечислите формы гипертрофического гингивите:

1) десквамативная, атрофическая
2) дистрофическая
3) отечная, фиброзная
4) аллергическая, медикаментозная

Правильный ответ - 3

59. Отметьте комплекс лечебных мероприятий при пародонтите легкой степени:

1) санация очагов инфекции
2) избирательное пришлифовывание
3) профессиональная гигиена полости рта
4) устранение пародонтопатогенных факторов
5) повышение общей реактивности организма
6) все перечисленное

Правильный ответ - 6

60. К неотложным хирургическим методам лечения пародонтита относятся:

1) кюретаж
2) лоскутная операция
3) гингивэктомия
4) вскрытие абсцесса, гингивотомия
5) пластика уздечек

Правильный ответ - 4

61. К современным методам лечения пародонтита относятся:

1) вектор-терапия
2) лоскутные операции с использованием метода направленной регенерации тканей
3) лазеротерапия
4) фотодинамическая терапия
5) озонотерапия

6) все вышеперечисленное
Правильный ответ - 6
62. Фагоцитоз – это?
1) процесс поглощения и переваривания клеткой корпускулярных частиц, в том числе микроорганизмов и погибших эндогенных клеток
2) состояние специфической иммунологической ареактивности
3) программированная гибель клеток
4) реакция клеток или корпускулярных частиц, нагруженных антигеном
Правильный ответ - 1
63. Лизоцим – это
1) антибактериальный фермент, присутствующий в гранулах фагоцитирующих клеток, слезной жидкости и слюне, расщепляющий пептидогликаны мембраны бактериальной клетки
2) белок растительного происхождения, связывающий специфические сахара на гликопротеинах и гликолипидах
3) фермент, содержащийся в лизосомах, участвующий во внутриклеточном разрушении чужеродного антигена
4) главный вазоактивный амин, высвобождающийся из гранул базофилов периферической крови и тучных клеток
Правильный ответ - 1
64. К какому типу волокон относится арматура Glas Span?
1) стекловолокно
2) керамическое волокно
3) полимерное волокно
4) арамидное волокно
Правильный ответ - 2
65. В каких клинических ситуациях наиболее целесообразно использовать арматуру в виде жгутика?
1) шинирование боковой группы зубов
2) шина как ретейнер после ортодонтического этапа лечения
3) восстановление единичного дефекта зубного ряда
4) травма зуба
Правильный ответ - 1,3
66. Адгезивные системы какого поколения не рекомендованы для шинирования без создания пропила на эмали?
1) 4 поколение
2) 5 поколение
3) 6 поколение
4) 7 поколение
Правильный ответ - 3,4
67. Что наиболее часто отмечается в анамнезе у больных с десквамативным глосситом?
1) хронический колит;
2) гипоацидный гастрит;
3) дисбактериоз;
4) сосудистая патология;
5) нарушение обмена веществ.
Правильный ответ - 2
68. Складчатый язык в клинике проявляется:
1) утолщением мышечного слоя и наличием складок и борозд на спинке языка;
2) увеличением нитевидных сосочков;
3) появлением эрозий.

Правильный ответ - 1

69. Ложный волосатый язык часто сочетается с

1) герпесом;
2) кандидозом;
3) лейкоплакией.

Правильный ответ - 2

70. Глоссит Гентер-Меллера является проявлением

1) аллергии;
2) B_{12}-витамино дефицитной анемии;
3) Глистной инвазии.

Правильный ответ - 2

71. Длительность существования афты при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите

1) до 7 дней;
2) 10-12 дней;
3) 14 дней.

Правильный ответ - 2

72. Какие высыпные элементы характерны для эксфолиативного хейлита?

1) пузырьки;
2) папулы;
3) чешуйки.

Правильный ответ - 3

73. Локализация высыпных элементов при эксфолиативном хейлите

1) от линии Клейна до середины красной каймы губ;
2) поражается красная кайма губ и углы рта;
3) поражается красная кайма губ, кожа, углы рта.

Правильный ответ - 1

74. Экзематозный хейлит часто сочетается с

1) сахарным диабетом;
2) нейродермитом;
3) гиповитаминозами.

Правильный ответ - 2

75. Актинический хейлит является результатом неблагоприятного воздействия

1) высокого магнитного поля;
2) ультрафиолетового излучения;
3) перепада температур.

Правильный ответ - 2

76. Метеорологический хейлит часто встречается у рабочих

1) кожевенного производства;
2) химического производства;
3) строителей, моряков, продавцов уличной торговли.

Правильный ответ - 3

77. Интоксикация солями тяжелых металлов проявляется в полости рта в виде

1) диффузного катарального воспаления слизистой оболочки полости рта;
2) специфической клинической картины;
3) поражения красной каймы губ.

Правильный ответ - 2

78. Вибрация способствует

1) образованию клиновидных дефектов;
2) патологии тканей пародонта;
3) хейлитам.

Правильный ответ - 2

79. У кондитеров и рабочих мукомольного производства характерно развитие
1) быстро прогрессирующего множественного кариеса;
2) клиновидных дефектов;
3) эрозий эмали.
Правильный ответ - 1
80. У рабочих на производствах синтетических моющих средств характерно
1) поражение твердых тканей зубов;
2) частое возникновение герпеса;
3) аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта.
Правильный ответ - 3
81. Повышенная запыленность производственных помещений способствует возникновению заболеваний
1) дыхательной системы;
2) опорно-двигательного аппарата;
3) сердечно-сосудистой системы.
Правильный ответ - 1
82. Пятно может быть:
1) желтое
2) синее
3) белое
4) красное
5) сосудистое
Правильный ответ - 5
83. Пузырек располагается в:
1) эпителии
2) собственной пластинке слизистой
3) подслизистом слое
4) мышечной ткани
5) жировых клетках
Правильный ответ - 1
84. Сухость полости рта встречается при приеме:
1) антибиотиков
2) гипотензивных средствах
3) нестероидных противовоспалительных препаратов
4) адаптогенов
5) гормональных препаратов
Правильный ответ - 2
85. В комплекс противовоспалительной терапии входят:
1) стероидные препараты
2) антигистаминные препараты
3) антиоксиданты
4) десенсибилизирующие средства
5) все вышеперечисленное
Правильный ответ - 5
86. К симптоматической терапии относится:
1) устранение местных травмирующих факторов
2) противовоспалительная терапия
3) устранение отека
4) улучшение микроциркуляции
5) антибактериальная терапия
Правильный ответ - 3
87. Длительность инкубационного периода ВИЧ-инфекции зависит:

1) от пути заражения
2) от исходного иммунного статуса
3) от количества попавшего в организм возбудителя
4) от всех вышеназванных факторов

Правильный ответ - 4

88. В каком периоде ВИЧ-инфекции в полости рта обнаруживаются СПИД-маркерные заболевания?

1) первичном периоде
2) вторичном периоде
3) состоянии предСПИДа

Правильный ответ - 3

89. Преимущественная локализация волосистой лейкоплакии в полости рта:

1) внутренняя поверхность щек
2) дно полости рта
3) проявления возможны на любом участке СОПР
4) нижнебоковая поверхность языка

Правильный ответ - 4

90. К СПИД-маркерным заболевания в полости рта относятся:

1) кандидоз, саркома Капоши, язвенно-некротический гингивостоматит, волосистая лейкоплакия
2) саркома Капоши, красный плоский лишай, язвенно-некротический гингивостоматит, дискоидная красная волчанка
3) волосистая лейкоплакия, опоясывающий лишай, красный плоский лишай, кандидоз

Правильный ответ - 1

91. Клинические признаки гальванического синдрома

1) сухость полости рта
2) наличие металлических включений
3) гальванические токи
4) жжение слизистой оболочки полости рта
5) все вышеперечисленное

Правильный ответ - 5

92. Травму слизистой оболочки полости рта вызывают:

1) микроорганизмы
2) заболевания ЖКТ
3) лекарственные средства
4) курение
5) инсоляция

Правильный ответ - 4

93. Диагностическим признаком парестезии слизистой оболочки полости рта является:

1) жжение слизистой оболочки
2) отсутствие болевых ощущений во время приема пищи
3) нарушение микроциркуляции
4) наличие грибковой флоры
5) нарушение сна

Правильный ответ - 2

94. Клинические формы красного плоского лишая

1) острая
2) хроническая
3) эрозивно-язвенная
4) некротическая
5) отечная

Правильный ответ - 3

95. При акантолитической пузырчатке пузыри возникают

1) на коже
2) на слизистой оболочки полости рта
3) на роговице глаза
4) на коже слизистой оболочки
5) на слизистой оболочке и роговице

Правильный ответ - 4

96. Основным диагностическим методом при малигнизации язвы в полости рта является

1) нарушение сроков эпителизации
2) инфильтрат в основании язвы
3) утолщение краев язвы
4) боль в полости рта
5) гистологическое исследование

Правильный ответ - 5

97. Для дифференциальной диагностики пузырчатки проводят

1) биохимические анализы
2) цитологическое исследование
3) электроодонтодиагностику
4) люминесцентное исследование
5) микробиологическое исследование

Правильный ответ - 2

98. Противопоказания к физиотерапевтическому лечению

1) гнойные процессы
2) опухолевые процессы
3) острые заболевания
4) хронические заболевания
5) беременность

Правильный ответ - 2

99. Д'Арсонвализация относится к методам:

1) электролечения
2) светолечения
3) магнитотерапии
4) температурного воздействия
5) вибролечения

Правильный ответ - 1

100. Гидропроцедуры воздействуют на организм факторами

1) температурным
2) массажным
3) химическим
4) ароматическим
5) все вышеперечисленное

Правильный ответ - 5