


Результаты диспансеризация взрослого населения за 2017 г.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится с 2013 года. В 2017 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987 и далее через 3 года до 1915 г. По итогам работы выполнено 66 % годового плана диспансеризации.

Структура факторов риска у лиц, прошедших диспансеризацию в Поликлинике с КДЦ: при анкетировании поведенческие факторы риска (нерациональное питание, недостаточная физическая активность, курение, риск пагубного потребления алкоголя, риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача) выявлены у каждого второго, в ряде случаев – 2 и более фактора риска).

Факторы риска ХНИЗ



Повышенное содержание глюкозы в крови выявлено в 4,8 %, высокий суммарный сердечно-сосудистый риск – в 14,2 % случаев; очень высокий – в 1,8 %, отягощенная наследственность – в 16,6 %. Эта информация говорит о необходимости активизации работы государства по формированию в обществе профилактической среды, начиная с раннего детского возраста.



Структура впервые выявленных заболеваний

Таблица №1

Классы заболеваний	Ранговое место	Относительные
Болезни органов дыхания	5	0,04
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	2	0,07
в т.ч.: сахарный диабет		0,5
- ожирение		0,2
Болезни нервной системы	6	0,02
Болезни системы кровообращения	1	0,54
в т.ч.: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением		0,5
- ишемическая болезнь сердца		0,23
- цереброваскулярные болезни		0,05
Болезни органов пищеварения	4	0,04
Болезни мочеполовой системы	3	0,04
Прочие заболевание		0,1

При проведении диспансеризации за анализируемый период выявлено 87 злокачественных новообразований. В 60 % болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ выявлены у лиц в возрасте 39-60 лет и старше, преимущественно женщин.

Группы здоровья



ВЫВОДЫ

1. Выполнение плана диспансеризации за 2017 год составило 66 % годового.
2. В структуре групп здоровья, определяемых по итогам диспансеризации, лица с I группой составили 15,7% , со II группой – 14,6%, с III группой – 69,7% (из них с группой IIIa – 55,7%).
3. Количество граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями составило 65 в относительных показателях.
4. Распространенность поведенческих факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний подтверждает необходимость усиления межсекторальной работы по формированию в обществе профилактической среды.