

Темы санитарного просвещения должны быть рассчитаны на:

- 1) беременных
- 2) неорганизованное население
- 3) организованное население
- 4) конкретную аудиторию

Через какое время водородный показатель кривой Стефана, достигнув критического уровня, приходит к норме?

- 1) 15 мин
- 2) 30 мин
- 3) 60 мин
- 4) 40 мин

Людям со здоровым пародонтом рекомендуется чистить зубы методом:

- 1) Леонарда
- 2) Фонеса
- 3) стандартным методом
- 4) Рейте

Чистка зубов должна продолжаться:

- 1) 2,5-3,5 минуты
- 2) 1-2 минуты
- 3) 4-5 минут
- 4) 0,5-1 минуту

Гигиенические зубные пасты оказывают:

- 1) очищающее, дезодорирующее действие
- 2) противовоспалительное
- 3) противокариозное
- 4) противогрибковое

Стоматологическая заболеваемость в детском возрасте изучается с целью:

- 1) определения структуры стоматологической заболеваемости и уровня оказания стоматологической помощи детям
- 2) получения объективных данных для оценки эффективности действующих стоматологических оздоровительных программ
- 3) формирования и стимулирования общественного сознания в поддержку развития стоматологического обслуживания детей
- 4) определения комплекса выше указанных задач

Укажите модель диспансерного наблюдения для школьника, имеющего III степень активности кариеса:

- 1) диспансерный осмотр 1 раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр по обращаемости
- 4) диспансерный осмотр 3 раза в год, через каждые 3-4 месяца

Противокариозными пастами являются:

- 1) «Лесная»
- 2) «Ягодка»
- 3) «Неопоморин»
- 4) «Фтородент»

Ирригаторы используют для:

- 1) снятия зубных камней
- 2) очистки полости рта и массажа десен
- 3) снятия мягких зубных отложений
- 4) обследования полости рта

Межзубные промежутки чистят:

- 1) межзубными стимуляторами
- 2) зубными эликсирами
- 3) зубочистками, зубными нитями
- 4) ирригаторами

Первичная профилактика кариеса – это:

- 1) лечение кариеса
- 2) восстановление утраченной функции в зубочелюстной системе
- 3) комплекс общих мероприятий по укреплению здоровья и специальные мероприятия
- 4) лечение осложнений кариеса зубов

Профилактика кариеса у ребенка должна начинаться в периоде:

- 1) новорожденности
- 2) внутриутробного развития
- 3) ясельного возраста
- 4) дошкольного возраста

Реагенты для определения гигиенического индекса:

- 1) метиленовый синий
- 2) раствор Шиллера-Писарева
- 3) фуксин
- 4) любой из перечисленных

Укажите наиболее эффективный и доступный метод диагностики очаговой деминерализации эмали:

- 1) визуальный метод
- 2) метод витального окрашивания
- 3) рентгенологическое исследование
- 4) электроодонтометрия

Для выявления очаговой деминерализации используют растворы:

- 1) эритрозина
- 2) Шиллера-Писарева
- 3) фуксина
- 4) 2% р-р метиленового синего

Для профилактики местной гипоплазии необходимо:

- 1) принимать препараты тетрациклина
- 2) чистить зубы 2 раза в день
- 3) проводить аппликации глюконатом кальция...
- 4) своевременно лечить или удалить молочный зуб

Для профилактики флюороза:

- 1) изменяют количество фтора в питьевой воде
- 2) назначают витамины
- 3) герметизируют фиссуры зубов
- 4) покрывают зубы фторлаком

При наличии клиновидного дефекта необходимо чистить зубы, исключая движения щеткой:

- 1) вертикальные
- 2) горизонтальные
- 3) круговые
- 4) подметающие

Гигиенический индекс:

- 1) индекс Грина – Вермиллиона
- 2) индекс PI
- 3) индекс РМА
- 4) индекс Muhlemann

После серебрения обработанные поверхности становятся:

- 1) синего цвета
- 2) черного цвета
- 3) белого цвета
- 4) красного цвета

Среди стрептококков наибольшее значение в возникновении кариеса имеют:

- 1) Str. mutans
- 2) Str. mitis
- 3) Str. sanguis
- 4) Str. Salivarius

Деминерализация эмали начинается:

- 1) в поверхностном слое
- 2) в подповерхностном
- 3) в среднем
- 4) в глубоком

Механизм десенситивного действия солей калия

при повышенной чувствительности зубов заключается:

- 1) в obturации дентинных канальцев
- 2) в восстановлении внутриканальцевого давления
- 3) в инактивации нервных окончаний в дентинных канальцах
- 4) в перестройке и уплотнении твердых тканей зуба

При оценке индекса Федорова-Володкиной какому гигиеническому состоянию соответствует его цифровое значение 2,4?

- 1) удовлетворительному
- 2) плохому
- 3) неудовлетворительному
- 4) очень плохому

Укажите формулу фторapatита:

- 1) $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}$

- 2) $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_5\text{F}_2\text{OH}$
- 3) $\text{Ca}_8(\text{PO}_4)_6\text{F}_2(\text{OH})_2$
- 4) $\text{Ca}_8(\text{PO}_4)_5\text{F}_2$

Удовлетворительная эффективность гигиены согласно индексу РНР соответствует значениям:

- 1) 0,1-0,6
- 2) 0,7-1,6
- 3) 1,7 и выше
- 4) 0,5-0,6

Поражение постоянных зубов одного срока минерализации характерно для:

- 1) эрозии эмали
- 2) системной гипоплазии
- 3) местной гипоплазии
- 4) очаговой деминерализации эмали

Очень плохому уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной соответствуют значения:

- 1) 1,1-1,5
- 2) 1,6-2,0
- 3) 2,1-2,5
- 4) 3,5-5,0

Для определения индекса CPITN зубной ряд условно делится на:

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 8 секстантов

Раствор эритрозина используют для:

- 1) индикации зубного налета
- 2) выявления очаговой деминерализации
- 3) выявления воспаления десны
- 4) все вышеперечисленное

Для определения интенсивности кариеса зубов у пациента используется индекс:

- 1) РМА
- 2) CPITN
- 3) РНР
- 4) КПУ

Наиболее оптимальные сроки для проведения герметизации фиссур и естественных ямок:

- 1) первые 1-1,5 года после прорезывания зуба
- 2) в течение 5 лет после прорезывания
- 3) в любые сроки после прорезывания
- 4) все выше перечисленное

К неудовлетворительной гигиене полости рта может привести:

- 1) использование зубной щетки в течение 2 месяцев
- 2) использование зубной щетки в течение года
- 3) чистка зубов два раза в день

4) чистка зубов в течение 3 минут

Дайте рекомендации пациенту после покрытия зубов фтор-лаком:

- 1) не есть 2 часа после процедуры
- 2) не пить 2 часа после процедуры
- 3) не чистить зубы вечером после процедуры
- 4) все перечисленные

Раствор, состоящий из 2 г йода, 4 г йодистого калия, 200 мл дистиллированной воды, это:

- 1) р-р Шиллера-Писарева
- 2) р-р йод-йодистого калия
- 3) р-р Люголя
- 4) р-р фуксина

Сколько слоев имеет зубная бляшка в своем составе?

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8

Зубное отложение, располагающееся под маргинальной десной, невидимое при визуальном осмотре, плотное и твердое, темно-коричневого или зелено-черного цвета, плотно прикрепленное к поверхности зуба – это:

- 1) кутикула
- 2) пелликула
- 3) зубной налет
- 4) поддесневой зубной камень

Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме – это форма проведения стоматологического просвещения:

- 1) индивидуальная
- 2) групповая
- 3) массовая
- 4) популяционная

Оптимальная концентрация фторида в питьевой воде в районах с умеренным климатом составляет:

- 1) 0,5 мг/л
- 2) 0,8 мг/л
- 3) 1,0 мг/л
- 4) 1,2 мг/л

Для профилактики кариеса покрытие зубов фторидсодержащим лаком обычно проводят:

- 1) 1 раз в год
- 2) 4 раза (по 2 процедуры через неделю) в год
- 3) 4 раза в год (1 раз в 3 месяца)
- 4) 6 раз в год (1 раз в 2 месяца)

С помощью какого инструмента определяется наличие над- и поддесневого зубного камня?

- 1) пуговчатый зонд
- 2) стоматологическое зеркало
- 3) стоматологический зонд
- 4) визуально

Ребенку с острым кариесом Вы порекомендуете средства гигиены, содержащие:

- 1) триклозан
- 2) фтор и кальций
- 3) хлоргексидин
- 4) нитрат калия

В каком году впервые в России было осуществлено фторирование питьевой воды?

- 1) 1953
- 2) 1980
- 3) 1959
- 4) 1965

Фторирование воды, соли и молока относится:

- 1) к групповой профилактике
- 2) к вторичной профилактике
- 3) к первичной профилактике
- 4) к этиотропной профилактике

Санитарное просвещение относят:

- 1) к первичной профилактике
- 2) к вторичной профилактике
- 3) к третичной профилактике
- 4) к этиотропной профилактике

Тяжелая форма МЭЭ:

- 1) синдром Бехчета
- 2) синдром Стивенса – Джонсона
- 3) синдром Гриншпана
- 4) феномен Артюса

Коммунальные методы профилактики относятся:

- 1) к первичной профилактике
- 2) к вторичной профилактике
- 3) к третичной профилактике
- 4) к групповой профилактике

Обучение гигиеническим навыкам детей в возрасте 2-3 года строиться в виде:

- 1) лекций
- 2) игры
- 3) беседы
- 4) урока

Интенсивность кариеса постоянных зубов оценивается индексом:

- 1) КПУ (п)
- 2) КПУ (з)
- 3) кп (п)
- 4) кп (з)

Аппликации р-ра глюконата кальция проводят в течение:

- 1) 5 мин
- 2) 10 мин
- 3) 15-20 мин
- 4) 10-15 мин

Очень плохому уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной соответствуют значения:

- 1) 1,6-2,0
- 2) 2,1-2,5
- 3) 2,6-3,4
- 4) 3,5-5,0