


КОМБАТАНТНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Развитие систем оказания медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в военных конфликтах прошлого и настоящего / С. В. Кульнев [и др.]. - Текст : непосредственный // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии . - 2018. - N 4. - С. 169-173. - Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=36462903>




Отражен процесс становления и развития систем оказания медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в военных конфликтах, начиная с древних времен до настоящего времени. Освещены такие вопросы, как организация лечения раненых и больных и их эвакуации в армиях Древней Греции, Римской империи, европейских армиях эпох Средневековья и Возрождения, Московского государства, Российской империи, Союза Советских Социалистических Республик и Российской Федерации.

Торгашов, М. Н.

Последствия стрессовых воздействий и хроническая боль как предикторы ускоренного старения / М. Н. Торгашов, В. С. Мякотных // Клиническая геронтология : науч.-практ. реценз. журнал. - 2018. - **№ 9/10**. - С. 70 - 72. - Библиогр. в конце ст.


<https://elibrary.ru/item.asp?id=35418987>



Цель исследования - определение клинико-патогенетических взаимоотношений последствий боевого стресса, хронических болевых синдромов и феномена ускоренного старения у участников боевых действий. Материал и методы. Наблюдались 156 ветеранов современных войн в возрасте от 24 до 69 лет. В определении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) применялся опросник травматического стресса И.О. Котенева.

Особенности адаптации после психического травматического стресса у военнослужащих, выполнявших специальные задачи / Н. В. Зеленина [и др.] // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии . - 2018. - № 3. - С. 153-158. - Библиогр. в конце ст.


<https://elibrary.ru/item/asp?id=37298642>



Признаки парциального посттравматического стрессового расстройства у здоровых военнослужащих-комбатантов снижают самооценку качества жизни, но не оказывают заметного влияния на профессиональный аспект социального функционирования в благоприятных условиях. Эти военнослужащие нуждаются в проведении медико-психологической коррекции и реабилитации для профилактики развития дезадаптации в напряженных условиях деятельности.


Совершенствование автоматизации информационного обеспечения медицинской реабилитации и динамического контроля за состоянием здоровья участников войн и вооруженных конфликтов / Ю. М. Захаров [и др.] // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии . - 2018. - № 3. - С. 225-232.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=37298656>



Активный динамический контроль за состоянием здоровья с использованием автоматизированных информационных систем позволяет решать проблему восстановления здоровья у участников войн и военных конфликтов, обеспечивает получение медицинской информации, необходимой для оценки состояния здоровья участников войн, определение объемов и состава лечебно-оздоровительных мероприятий.


Боевое посттравматическое стрессовое расстройство :
эволюция понятия от «синдрома раздраженного сердца» до
«психогенно-органического расстройства» / С. Г. Сукиасян [и
др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -
2019. - Том 119, N 6. - С. 144 - 151. - Библиогр. в конце ст.



В обзоре литературы приводятся сведения о проблеме травмы и посттравматических расстройств, являющейся актуальнейшей в мировой психиатрии в силу ее научного, практического и эпидемиологического значения и ряда других аспектов. Представлен исторический ряд концепций, объясняющих развитие посттравматических стрессовых расстройств. Уделено внимание эволюции концепций - от психогенных к комплексным, с формированием биопсихосоциального подхода к проблеме. Проанализирована динамика развития критериев диагностики в соответствии с международными классификациями.

Повышение эффективности комплексной терапии посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих-комбатантов с помощью тренингов биологической обратной связи по амплитуде систолической волны / Н. В. Зеленина [и др.] // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2019. - N 4. - С. 88 - 95. - Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=41661185>



Амплитуда систолической волны является прогностическим показателем в континууме здоровье - болезнь и может быть использована в качестве чувствительного физиологического параметра при БОС-тренинге по преодолению проявлений ПТСР Сознательное вовлечение военнослужащих-комбатантов в лечебный процесс за счет включения БОС-тренингов по амплитуде систолической волны в комплексную терапию ПТСР улучшает результат терапии и способствует повышению качества жизни.

Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы организма ветеранов после воздействия боевого стресса и травм / Т. Е. Потемина [и др.]. - Текст : непосредственный // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ" (Реабилитация, Врач и Здоровье). - 2019. - N 6. - С. 125 - 132. - Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=42575356>



Сердечно-сосудистые заболевания и коморбидные психосоматические расстройства тесно связаны с боевым стрессом. Обобщены результаты обследований 350 ветеранов, рассмотрены возможные патогенетические пути формирования выявленных патологических изменений.


Торгашов, М. Н.

Стресс-индуцированная патология и ускоренное старение / М. Н. Торгашов, В. С. Мякотных // Успехи геронтологии. - 2019. - Том 32, N 4. - С. 492 - 501. - Библиогр. в конце ст.



Проведено исследование с привлечением 317 бывших участников боевых действий 24-69 лет. Целью исследования было определение закономерностей возрастной динамики стрессиндуцированной патологии у участников боевых действий для выработки концепции их ускоренного старения как итоговой составляющей последствий боевого стресса. Оказалось, что по отношению к возрасту и периоду воздействия факторов боевого стресса вначале манифестировала патология опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и артериальная гипертензия, затем сердечно-сосудистая патология, связанная с атеросклерозом.

Дезадаптивные изменения в нервной системе после воздействия боевого стресса и травм / Т. Е. Потемина, А. А. Зуйкова, С. В. Кузнецова, А. В. Перешеин //Вестник медицинского института "РЕАВИЗ" (Реабилитация, Врач и Здоровье). - 2019. – N 4. - С. 72 - 77.
– Библиогр. в конце ст.



<https://elibrary.ru/item.asp?id=41334001>

Локальные конфликты часто вызывают развитие посттравматических психо-неврологических расстройств. В проведенном исследовании патология нервной системы обнаружена в 51,7 % случаев. Наблюдались аффективные состояния, психогении, расстройства личности, психоорганический синдром, аддиктивные расстройства с высоким уровнем коморбидности.

Систематизация подходов к организации профилактики психических расстройств у ветеранов боевых действий / А. Л. Сухоруков, А. Г. Соловьев, Е. Г. Ичитовкина, Е. Ю. Голубева // Успехи геронтологии. - 2020. - Том 33, N 4. - С. 691 - 694. – Библиогр. в конце ст.


Предложено в рамках Концепции развития психиатрической службы МВД России предусмотреть проведение целенаправленной профилактической работы с комбатантами - действующими сотрудниками силовых структур, включающей раннюю диагностику начальных форм психических расстройств, своевременное оказание лечебно-реабилитационной помощи с последующим системным мониторингом состояния их психического здоровья в ведомственных учреждениях здравоохранения.



Использование биоакустической психокоррекции в комплексной реабилитации военнослужащих с различными психическими расстройствами, получивших ранения в контртеррористических операции / В. В. Булавин, В. Н. Филатов, А. С. Кальманов [и др.] // Военно-медицинский журнал. - 2020. - Том 341, N 9. - С. 62-65. - Библиогр. в конце ст.

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43910031>

Изучены психические расстройства у 480 раненых, получивших боевую травму в контртеррористической операции в Дагестане (1999-2001). Психические расстройства диагностированы у 408 раненых, распределенных в клинические группы: психологические стрессовые реакции (50,8%), патологические психогенные реакции (28,9%), посттравматические стрессовые расстройства (20,3%). Применение классических методов медико - психологической реабилитации с использованием биоакустической коррекции способствует успешной реабилитации раненых, повышению социальной активности и качества жизни раненых.




[Крайнюков, П. Е.](#)

Тактическая медицина-новая концепция для войн "нового типа" / П. Е. Крайнюков, И. М. Самохвалов, В. А. Рева. - Текст : непосредственный // Военно-медицинский журнал. - 2021. - Том 342, N 5. - С. 4-17. - Библиогр. в конце ст.


<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624409>

Термин «тактическая медицина» имеет право на существование. Вместе с тем система и содержание лечебно – эвакуационных мероприятий требуют дальнейшего совершенствования, в связи с чем необходимо пересмотреть подходы к объемам и срокам оказания медицинской помощи в зонах боестолкновения, эвакуации, к транспортировке, снабжению и обеспечению безопасности личного состава. Организация медицинского обеспечения должна быть направлена на улучшение оказания медицинской помощи, в первую очередь в зоне боевых действий. Представлены перспективные объемы оказания догоспитальной помощи разными категориями военнослужащих в рамках концепции тактической медицины и задачи по ее модернизации в Вооруженных Силах.



Динамика формирования психических расстройств у комбатантов МВД России / А. А. Рассоха, Е. Г. Ичитовкина, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьев // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2022. - № 2. - С. 52 - 59.
- Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=49265563>




Немногочисленные исследования психического здоровья комбатантов, уволившихся из силовых структур, свидетельствуют о его неблагополучии.

Цель - катанестический анализ динамики формирования психических расстройств и расстройств поведения (V класс по МКБ-10) у комбатантов при увольнении из МВД России по выслуге лет, дающей право на пенсию. В период службы в отмечается достоверное увеличение органических, включая симптоматические психические расстройства, зависимостей, связанных с употреблением психоактивных веществ (F10-F19), и уменьшение невротических, связанных со стрессом, и соматоформных расстройств. Для повышения качества оказания психиатрической помощи комбатантам МВД России необходимо совершенствовать подходы к оказанию психиатрической помощи в структуре ведомственных многопрофильных учреждений здравоохранения с внесением изменений в действующий порядок терапии и медико-психологической реабилитации при возвращении сотрудников из зон боевых действий.

[Евдокимов, В. И.](#)

Развитие направлений научных исследований по боевому стрессу в отечественных статьях с использованием программы VOSviewer (2005-2021 гг.) / В. И. Евдокимов, В. К. Шамрей, М. С. Плужник // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2023. - N 2. - С. 99-116.
- Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=53960581>




Проведенное исследование показало смещение акцента в содержаниях отечественных статей по боевому стрессу с медицинских проблем на социально- психологические его последствия, увеличение исследований по диагностике поведения человека в условиях витального стресса, формирование психической устойчивости к стрессу, психопрофилактики, психологической коррекции и психотерапии стресса и постстрессовых расстройств. Научная электронная библиотека создает большие информационные возможности для исследователей, около 80 % статей по боевому стрессу представлены в полной версии бесплатно.

Проблемы диагностики расстройств адаптации у военнослужащих Вооруженных Сил / А. В. Лобачев, А. А. Марченко, В. К. Шамрей, О. С. Виноградова. - Текст : непосредственный // Военно-медицинский журнал. - 2023. - Том 344, N 5. - С. 4-12. - Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=54161736>


Представлен анализ психических нарушений, которые возникают у военнослужащих с расстройствами адаптации. Исследование синдромологической структуры, анамнестических и катamnестических сведений показало, что текущие диагностические критерии МКБ-10 не всегда позволяют дать точный диагноз при расстройствах адаптации у военнослужащих. Установлено, что использование психометрических шкал не позволяет повысить точность диагностических заключений



Стресс - ассоциированные психические расстройства у военнослужащих / Д. В. Тришкин, А. А. Серговец, В. К Шамрей [и др.] // Военно-медицинский журнал. - 2023. - Том 344, N 6. - С. 4-14.

- Библиогр. в конце ст.


<https://elibrary.ru/item/asp?id=54164363>



Проанализированы патогенетические механизмы, особенности клинической картины и современные подходы к оказанию специализированной медицинской помощи при стресс - ассоциированных психических расстройствах у военнослужащих в условиях боевых действий. Патогенетические механизмы данной патологии до настоящего времени остаются не до конца понятными и изученными. Показаны наличие периодизации стресс - ассоциированных психических расстройств (острые, отставленные формы), их достаточно большой спектр, не ограничивающийся посттравматическим стрессовым расстройством, а также возможность патокинеза - трансформации одной из нозологических форм этой патологии в другую. Установлено, что такой подход к диагностике стресс - ассоциированных расстройств позволяет оказывать дифференцированную психиатрическую помощь на различных этапах медицинской эвакуации (начиная с передового края), что способствует максимально быстрому возвращению военнослужащих к выполнению своих обязанностей.

Психофизиологический подход к оценке и прогнозированию психогенных потерь в современных вооруженных конфликтах / Ю. Л. Старенченко, Е. А. Чернявский, В. В. Юсупов [и др.]. - Текст : непосредственный // Военно-медицинский журнал. - 2023. - Том 344, N 9. - С. 10-13. - Библиогр. в конце ст.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=54886473>



Рассмотрены основные положения психофизиологического подхода к изучению психогенных нарушений воинской деятельности в условиях проведения стратегических учений. Проанализированы данные изучения критериев эффективности воинской деятельности, личностных показателей реактивности (личностной тревожности) у военнослужащих с наличием/отсутствием опыта ведения боевых действий в период до и после проведения учений. Для эффективного решения задач медицинской службы по профилактике психогенных нарушений рекомендована разработка методики прогноза психогенных потерь комбатантов в условиях современных вооруженных конфликтов.